

# Fauna

# Oso negro americano

*Ursus americanus*




Foto: Alan Vázquez

## Familia: Ursidae

**Descripción:** Se caracteriza por ser el más pequeño entre las especies de osos que existen, su cuerpo tiene una longitud total de 1.7 metros en promedio. Tienen un peso variable de acuerdo al sexo, los machos pueden alcanzar 115 a 270 kg, y las hembras de 92 a 140 kg aproximadamente. La longitud de su cola es alrededor de 12 cm.

Su color más común es negro y algunos otros miembros de su especie pueden ser café chocolate o canela.

Poseen un pelaje corto y lacio. Tienen cinco dedos con zarpas largas, afiladas, negras, ganchudas y no retractiles.

**Reproducción:** Generalmente alcanzan la madurez sexual entre los tres y los cinco años de edad. La gestación dura entre 210 a 215 días.

Normalmente tienen de 2 a 3 crías por camada, los cachorros nacen en una guarida mientras la madre está en hibernación que es dormir durante el invierno. Al nacer los cachorros pesan entre 200 y 450 g. Nacen ciegos, sin pelo y permanecerán con su madre en el refugio hasta la primavera. Las hembras dan a luz cada dos o tres años, ya que el desarrollo de los cachorros es lento y necesitan del cuidado materno durante sus dos primeros años de vida.

**Hábitat:** Suelen vivir en bosques y zonas de arbustos, así como también en montañas y pantanos. Pueden vivir en zonas con clima frío, templado o semiárido.

**Distribución:** Se han reportado poblaciones reproductivas en Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

**Alimentación:** Aunque están clasificados como carnívoros, la mayor parte de su dieta se compone de bayas, flores, hierbas, tubérculos y frutos secos. Complementan su alimentación con carroña, peces, insectos, miel y ardillas.

## Dato Curioso

Los antiguos pueblos originarios de Norteamérica creían que el oso negro americano era un animal sagrado y con algunos poderes sobrenaturales, por eso su caza se realizaba de manera muy respetuosa y casi ceremoniosa.

## Dato Relevante

Son excelentes trepadores, más ágiles de lo que aparentan por ser tan corpulentos; en distancias cortas logran alcanzar una velocidad de hasta 40 Km/h.

Sus ojos les permiten tener una profunda percepción visual y la

## Estatus de Conservación

Preocupación menor según la UICN Lista Roja

# Lagartija espinosa de panza azul

*Sceloporus parvus*



Foto: Francisco Pérez

## Familia: Phrynosomatidae

**Descripción:** Con tamaño pequeño este reptil puede llegar a medir alrededor de 18 a 20 cm de largo. Sus escamas son pequeñas pero adornadas con crestas en el centro como todos los ejemplares de este género. Es gris principalmente teniendo algunas escamas anaranjadas a los costados de su cuerpo y otras con detalles negros y celestes en su espalda, rostro con escamas de coloraciones amarillentas, su cola que es tan larga como su cuerpo es azul a los lados y su vientre como su nombre lo dice es de un color azul brillante y tiene una pequeña mancha rojo brillante en la parte de atrás de sus extremidades posteriores justo en la zona donde se unen con la cola. Las patas son pequeñas con dedos largos.

**Hábitat:** Se encuentra en lugares semiáridos y subtropicales suele descansar sobre rocas y troncos secos.

**Distribución:** Es endémica de México, encontrándose una gran cantidad en matorral Tamaulipeco.

**Alimentación:** Se alimenta de invertebrados y otras lagartijas pequeñas.

## Dato Curioso

Son muy territoriales.

Pueden llegar a ser más pequeñas que una moneda de un peso mexicano.

## Dato relevante

Son de hábitos diurnos (realizan sus actividades durante el día).

Aunque sus colores pueden parecer llamativos tiene una gran capacidad para confundirse con el entorno.

## Estatus de Conservación

Preocupación menor según la UICN Lista Roja

# Ocelote

*Leopardus pardalis*



Foto: Alan Vázquez

## Familia: Felidae

**Descripción** Es de tamaño mediano y puede llegar a medir entre 70 a 100 cm de largo y pesar alrededor de 6 a 15 kg. Su pelaje es corto y áspero, presenta una coloración amarillo pardo, con manchas negras bien definidas en forma de roseta o líneas longitudinales que se encuentran alrededor de su espalda y a los costados. La región del vientre es blanca con algunas manchas negras, cada patrón y disposición de las manchas es diferente en cada individuo. En la cabeza tiene líneas oscuras y en las mejillas dos rayas negras que encierran un área casi blanca. En el cuello tiene bandas negras. Sus piernas son largas siendo las traseras más anchas que las delanteras, las patas están provistas de almohadillas lo que le permite caminar sin hacer ruido. Tiene uñas largas, afiladas y retractiles. Sus orejas y ojos son grandes y expresivos. Con una cola peluda y corta.

**Hábitat:** Se encuentra principalmente en el bosque tropical perennifolio, subcaducifolio, caducifolio y en manglares, además del bosque mesófilo de montaña, el bosque espinoso y matorral xerófilo.

**Distribución:** En Tamaulipas puede ser potencialmente encontrado en la Sierra Madre Oriental, Sierras y Llanuras Occidentales, Sierra de Tamaulipas y Llanura Costera Tamaulipeca.

**Alimentación:** Es un carnívoro oportunista con preferencias a ciertas presas en particular. Puede cazar en los árboles, pero es especialista de caza en el suelo. Consumen principalmente mamíferos pequeños y en menor proporción algunos roedores grandes, raposas, murciélagos, aves, reptiles y peces.

## Dato Curioso

Sus rosetas son distintas de las de los otros dos felinos manchados de México: en el jaguar las rosetas no son cerradas o alargadas y tienen una mota en el interior, mientras que en el margay las manchas son compactas y oscuras.

El ocelote fue símbolo de poder, valentía y fortaleza para varias culturas prehispánicas y fue representado en códices, murales, vasijas, relieves o mitos.

## Dato relevante

Pertenece al conjunto de gatos silvestres manchados, que en México incluye además al jaguar y al margay.

## Estatus de Conservación

Preocupación menor según la UICN Lista Roja y en Peligro de Extinción según la NOM-059-SEMARNAT-2001

# Venado cola blanca

*Odocoileus virginianus*



## Familia: Cervidae

**Descripción:** Es un mamífero rumiante perteneciente a la familia de los Cérvidos, de talla mediana.

Su cuerpo es esbelto con patas relativamente largas y delgadas, cola reducida de un tamaño que va entre 95 a 220 cm de longitud y de color blanco en la parte dorsal. Durante el verano es color café castaño brillante o un poco grisáceo y en el invierno es grisáceo o pardo. Presenta una mancha blanca en forma de banda alrededor del morro y e la zona de los ojos, las crías nacen con manchas blancas en el lomo las cuales desaparecen con el paso del tiempo. Presenta dimorfismo sexual lo que significa que tiene diferencias físicas para la identificación de sexo. Los machos presentan astas en la parte superior de cabeza a la altura de las orejas, en Norteamérica, los venados pierden las astas entre enero y marzo y las nuevas empiezan a crecer entre abril y mayo, perdiendo la cubierta de su piel entre agosto y septiembre, estas adquieren su talla máxima entre los 4 y 5 años de edad. Los machos pesan entre 60 a 160 kg y las hembras entre 40 a 105 kg y llegan a medir entre 1.60 a 2.20 m.

**Reproducción:** El apareamiento ocurre de octubre a enero y el tiempo de gestación es de 195 a 212 días aprox. generalmente la hembra llega a tener de 1 a 3 crías por parto. La madurez sexual de las hembras es cerca de los dos años de edad, mientras que la de los machos es hasta los cuatro años de edad aprox. ntraron efectos secundarios desde leves hasta muy graves.

**Alimentación:** La dieta del venado de cola blanca se considera más variada que la de cualquier animal en su hábitat natural. Son capaces de consumir más de 500 tipos diferentes de plantas, pero esto dependerá de la región donde vivan. Estos alimentos también pueden variar en correspondencia con la época del año, hay ciertas frutas y flores de plantas que sólo pueden consumir durante determinados periodos de tiempo.

**Longevidad:** En vida libre generalmente no viven más de 10 años, pero se estima que puede llegar hasta los 20 años.

**Estado de conservación:** Esta especie ha sido cazada por muchos años, tanto como por su carne, piel y por deporte, esto aparentemente no ha traído una reducción importante. Globalmente es de menor importancia.

# Lagartija Espinosa Ventre Rosado

*Sceloporus variabilis*



Foto: Margarita Garza

Suelen ser muy tímidas y dóciles.

## Familia: Phrynosomatidae

**Descripción:** Es un reptil de tamaño pequeño que puede medir alrededor de 8 a 15 cm de longitud de cola a hocico. Es de color gris, en el área superior cuenta con manchas negras y detalles blancos en los bordes, en esa misma parte cuenta con dos líneas laterales de coloración más clara, en su etapa adulta presenta coloración rosa en el vientre de ahí viene su nombre. Las escamas en su cabeza son grandes y lisas, mientras que las que cubren el resto de su cuerpo son pequeñas, puntiagudas y aquilladas que presentan una cresta en el centro. Sus ojos son pequeños con pupilas redondas. Su cola es delgada y más larga que el cuerpo.

Su reproducción generalmente es en temporada de otoño y el periodo de incubación es de cuatro meses aproximadamente. El tamaño de camada va alrededor de 2 a 4 crías.

Las lagartijas adulto cuentan con un sentido protector con sus crías por lo que en presencia de otros animales no se alejan de sus pequeños.

**Hábitat:** Es encontrado en distintos ecosistemas como: en bosques, sabanas, matorrales y pastizales. Pero su lugar preferido principalmente es conformado por zonas semiáridas y rocosas.

### Dato Relevante:

Es una especie muy abundante en México, aunque muy difíciles de atrapar ya que son muy veloces.

**Su dieta incluye:** Alimentos de origen vegetal y algunos artrópodos como: escarabajos, mariposas y arañas

**Distribución:** Es nativo del sur de Estados Unidos, México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y Costa Rica. Su rango altitudinal oscila entre 0 y 2500 m s. n. m.. El individuo fotografiado fue localizado en un rancho cercano a Soto la Marina, Tamaulipas.

## Dato Curioso

Suelen ser muy tímidas y dóciles, si un humano se acerca a ellas se quedan quietas por un instante y después corren a esconderse bajo piedras y troncos.

### Fuentes:

Chaves, G., Lamar, W., Porras, L.W. & Sunyer, J. (2013). «*Sceloporus variabilis*». Lista Roja de especies amenazadas de la UICN 2013.2 (en inglés). ISSN 2307-8235. Consultado el 17 de octubre de 2023.

Enciclopedia - *Sceloporus variabilis* (consultado el 17 de octubre del 2023).

L. Canseco-Márquez y G. Gutiérrez-Mayén (2008). Clase Reptilia. Biodiversidad. <https://www.biodiversidad.gob.mx/pdf/libros/AvtparteB.pdf>

## Estatus de Conservación



Preocupación menor según la IUCN Red List

# Ardilla gris

*Sciurus alleni*



Su espesa cola les ayuda a mantener el equilibrio al trepar y saltar entre los árboles.

## Familia: Scuridae

**Descripción:** Es un roedor de aspecto amigable con pelaje gris que en ocasiones tiene coloraciones marrones en la parte superior, mientras que en la parte inferior cuenta con tonos blancos. La parte de su cuerpo que más llama la atención es su cola grande y espesa. Las orejas y los ojos son pequeños; los dientes son fuertes y los usan para abrir nueces. Estos pequeños pasan la mayor parte de su vida viviendo sobre los árboles, especialmente si estos cuentan con frutos con los que puedan alimentarse.

Su reproducción tiene lugar en cualquier época del año, aunque puede verse afectada cuando su fuente de alimento es escasa. El periodo de gestación es de 44 días aproximadamente y transcurridos estos días pueden llegar a nacer alrededor de 2 a 6 crías.

Para su hogar, construyen madrigueras conocidas como "Drey" en las bifurcaciones de los árboles. Las cuales son elaboradas principalmente de hojas secas, ramitas y cáscaras de bellotas. Aunque estos individuos suelen ser solitarios, los machos y las hembras pueden compartir sus nidos por cortos periodos de tiempo, como en época de reproducción o en temporada de invierno durante los días más fríos.

**Tamaño:** Su cuerpo mide entre 42 y 55 cm de altura y su cola de 20 a 30 cm de largo aproximadamente, el peso del adulto varía entre 400 y 600 gr.

**Hábitat:** Se encuentran principalmente en los bosques tropicales, abarcando desde el bosque espinoso semiárido hasta el bosque húmedo lluvioso. Algunos individuos viven en los árboles, bajando al suelo solamente para cambiarse de sitio y buscar alimento o agua.

**Distribución:** Se encuentran en las costas desde Sonora y Tamaulipas hacia el sur hasta Chiapas y la Península de Yucatán.

**Su dieta incluye:** Una gran variedad de plantas, insectos, huevos de aves y pequeños reptiles. Las ardillas que habitan en bosques de pino-encino, se alimentan principalmente de bellotas y piñones. Cuando el alimento escasea, recurren a las cortezas y partes blandas de las plantas.

## Dato Curioso

Sus dientes nunca dejan de crecer, y pueden crecer hasta 6 pulgadas por año. Sin embargo, nunca llegan a ser muy largos porque los desgastan constantemente cuando comen semillas duras.

Las ardillas tienen una memoria espacial muy precisa de la ubicación de sus almacenes de comida, y utilizan puntos de referencia cercanos y lejanos para recuperarlos.

## Dato relevante

Las ardillas tienen la facilidad de bajar los árboles de cabeza, esto lo logran volteando sus patas traseras hacia atrás permitiéndoles así sostenerse de los bordes de la corteza del árbol.

## Estatus de Conservación

"Preocupación menor según la UICN Lista Roja"

# Pecarí de collar

*Pecari tajacu*

**Familia:** Tayassuidae

**Descripción:** Parecido un cerdo, de color marrón cuando son juveniles y negro claro con apariencia de canas los adultos, sus orejas cortas y redondas, una banda en el cuello de color le da origen a su nombre. El hocico es similar al de los cerdos, es útil para cavar en busca de comida bajo la tierra o áreas de descanso en lugares húmedos. La cola es demasiado corta (vestigial) y sus colmillos no son expuestos, se les puede observar cuando abren su hocico como señal de alerta.

## Tamaño:

Longitud: 80 cm a 1.10 cm

Altura: 50 cm

## Hábitat:

Matorral xerófilo y desértico, selva baja y bosque de encino

## Alimentación:

Frutos, túberculos, raíces y pastos

## Estatus de Conservación

Least concern (LC)  
IUCN Red List



Fotografía por Lorena Lavín Arámburu



# Saltamontes Perezoso

*Taeniopoda tamaulipensis*

**Familia:** Romaleidae

**Descripción:** Tiene metamorfosis incompleta o hemimetábola, con tres estados de desarrollo: huevo, ninfa y adulto. Es de color marrón rojizo con puntos negros en sus alas exteriores, sin embargo, hay una variación en la coloración, con más razas del norte donde son más verdes y las del sur más brillantes. Las antenas son de color marrón azulado y las patas son rojizas cerca del cuerpo con tarsos púrpuras. Tiene una cresta a lo largo de la región superior y media del abdomen. Aproximadamente 2 pulgadas de largo.

## Dato Curioso

Se muestra un rojo carmesí brillante en las alas.

Tiene un patrón similar a un ojo cuando ambas alas se abren en vuelo como mecanismo de defensa.

## Presencia



Su habitat es en matorrales bajos, suelo de grava, planta de hoja ancha. Se distribuye en Coahuila, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas.



Fotografía por Marco Ibarra